



Utilizarea corectă a auto-injectorului cu adrenalină (AIA)

Recunoașteți semnele anafilaxiei



➔ Mflături ale gâtului, limbii și căilor respiratorii superioare.
(Senzația de strângere de gât, voce răgușită, dificultăți în înghițire).



➔ Debut brusc al respirației șuierătoare, al dificultății de a respira, al respirației zgomotoase.



➔ Amețeală, senzație de leșin, somnolență bruscă, oboseală, confuzie, piele palidă și asudată, pierderea cunoștinței.

Nu amânați



Dacă aveți vreun simptom de anafilaxie, utilizați de urgență AIA. Dacă aveți dubii, utilizați-l. Nu amânați. Apoi sunați la 999

Ce să faceți în caz de urgență




Utilizați AIA fără să amânați




Apelați imediat 999

spuneti anafilaxie



Dacă nu v-ați așezat atunci faceți-o

(vedeți poziționarea de mai jos)



Utilizați-vă cel de-al doilea AIA dacă starea dvs. nu s-a îmbunătățit după 5 minute

Poziționarea corectă

Așezați-vă și ridicați picioarele.



Dacă sunteți însărcinată, întindeți-vă pe partea stângă.




Nu vă ridicați. Rămâneți așezată chiar dacă vă simțiți mai bine.


Sprijiți-vă dacă aveți dificultăți cu respirația dar nu vă schimbați brusc poziția, întindeți-vă cât mai repede posibil.



Pregătiți-vă



1 Există 3 tipuri diferite de AIA. Să știți să îl folosiți pe al dvs.



2 Urmați instrucțiunile.



3 Să aveți mereu asupra dumneavoastră 2 AIA în dată.



4 Verificați în mod regulat data de expirare și înlocuiți AIA înainte de a expira.

Raportați o problemă/un defect.

Raportați orice defect pe care îl suspectați cu privire la AIA la programul Cardul Galben MHRA. Păstrați AIA defecte pentru investigații

