

Czego można spodziewać się po podaniu szczepionek



W niniejszej ulotce zostały przedstawione najczęstsze skutki uboczne po podaniu szczepionek, które mogą wystąpić u niemowląt i dzieci poniżej piątego roku życia.

Po podaniu szczepionki dziecko może przez chwilę popłakać. Uspokaja się jednak zwykle po przytuleniu lub nakarmieniu. U większości dzieci nie występują żadne inne reakcje.

Odczyn w miejscu podania szczepionki

U niektórych niemowląt może pojawić się obrzęk, zaczerwienienie lub mały twardy guzek w miejscu wkłucia, które może być bolesne przy dotyku. Te odczyny ustępują zwykle po dwóch, trzech dniach i nie wymagają leczenia.

Gorączka

Gorączka oznacza temperaturę ciała powyżej 38°C. U małych dzieci gorączka występuje dość często, ale jest zwykle niezbyt wysoka. Jeżeli twarz dziecka jest gorąca przy dotyku, wygląda na zaczerwienioną lub rozpaloną, dziecko może mieć gorączkę. Wysokość temperatury ciała można sprawdzić termometrem.

Kiedy niemowlę ma gorączkę

- **nie należy** wkładać go do wanny
- **nie należy** omywać go gąbką
- **nie należy** chłodzić go wentylatorem

Po podaniu szczepionki MenB

Gorączki można spodziewać się po podaniu każdej szczepionki, pojawia się jednak bardzo często po podaniu szczepionki MenB w połączeniu z innymi standardowymi szczepionkami w drugim i czwartym miesiącu życia dziecka. Gorączka świadczy o tym, że organizm dziecka reaguje na szczepionkę, chociaż jej brak nie oznacza, że szczepionka nie działa. Wysokość gorączki zależy indywidualnie od dziecka i nie świadczy o skuteczności szczepionki. Podanie paracetamolu obniży ryzyko wystąpienia gorączki, rozdrażnienia i ogólnego dyskomfortu (w tym bólu w miejscu wkłucia) po podaniu szczepionki.

Po zaszczepieniu dziecka w drugim i czwartym miesiącu życia należy podać mu łącznie trzy dawki paracetamolu (2,5 ml paracetamolu dla niemowląt w zawiesinie 120 mg/5 ml), aby zapobiec gorączce i złagodzić jej objawy. Pierwszą dawkę paracetamolu należy podać jak najszybciej po wizycie, podczas której podano szczepionkę w drugim miesiącu życia dziecka. Drugą dawkę należy podać od czterech do sześciu godzin później, a trzecią dawkę po kolejnych czterech - sześciu godzinach. W ten sam sposób należy postąpić po zaszczepieniu dziecka w czwartym miesiącu życia. Więcej informacji na temat paracetamolu można uzyskać od

Jeżeli w domu nie ma paracetamolu w płynie dla niemowląt, należy go zakupić przed pierwszą wizytą lekarską, na której zostanie podana szczepionka. Jest on ogólnie dostępny w aptekach i centrach handlowych.

pielęgniarki podczas wizyty z podaniem szczepionki. Można również otrzymać ulotkę z pisemnymi instrukcjami.

Po podaniu szczepionki MMR

MMR składa się z trzech różnych szczepionek (przeciwko odrze, śwince i różyczce). Każda z nich może wywołać inne reakcje, w różnym czasie po podaniu.

Od sześciu do dziesięciu dni po podaniu zaczyna działać szczepionka przeciwko odrze, która może wywołać gorączkę, wysypkę przypominającą odrę oraz utratę apetytu. Osoby z objawami poszczepiennymi nie zarażają innych.

Od dwóch do trzech tygodni po podaniu szczepionka przeciwko śwince może wywołać u niektórych dzieci objawy przypominające tę chorobę (gorączkę i powiększone węzły chłonne).

Szczepionka przeciwko różyczce może wywołać krótkotrwałą wysypkę i podwyższoną temperaturę ciała, najczęściej od 12 do 14 dni po jej podaniu. W nielicznych przypadkach wysypka utrzymuje się do sześciu tygodni.

Należy pamiętać, żeby nie podawać leków zawierających aspirynę dzieciom poniżej 16. roku życia.

Jeśli stan zdrowia dziecka budzi niepokój, warto zaufać swojemu instynktowi. Należy porozmawiać z lekarzem lub zadzwonić na infolinię NHS pod numer **111**.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli temperatura ciała dziecka wyniesie 39-40°C lub więcej albo wystąpią

u niego drgawki.

Jeżeli przychodnia zdrowia jest zamknięta i nie można skontaktować się z lekarzem, należy udać się do najbliższego szpitala z oddziałem pomocy doraźnej.

Jeżeli po zapoznaniu się z niniejszą ulotką reakcja dziecka na którąkolwiek ze szczepionek budzi w dalszym ciągu niepokój, należy porozmawiać z pielęgniarką lub lekarzem pierwszego kontaktu.

Kontrola bezpieczeństwa szczepionek

Przed dopuszczeniem do obrotu szczepionki muszą uzyskać licencję brytyjskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, który sprawdza ich bezpieczeństwo i skuteczność.

Po wprowadzeniu do programu bezpieczeństwo szczepionek jest stale monitorowane, a wszelkie nowe skutki uboczne są szybko zauważane i badane.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek można znaleźć na stronie internetowej www.mhra.gov.uk

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat skutków ubocznych szczepionek i szczepień można znaleźć w dostępnej w przychodni lekarskiej broszurze *A guide to immunisations up to 13 months of age (Przewodnik po szczepieniach ochronnych dla dzieci do 13. miesiąca życia)* lub na stronie internetowej NHS Choices www.nhs.uk.

