

واکسیناسیون کووید-19

چرا باید
منتظر بمانماطلاعاتی درباره موجودی واکسن
کووید-19

ایمن سازی در مقابل کووید-19

از خود محافظت کنید.

آیا می توانم واکسن کووید-19 را به صورت
خصوصی یا از داروخانه بخرم؟

خیر. واکسیناسیون کووید-19 تنها از طریق NHS برای گروههای واجد شرایط در دسترس است و رایگان می باشد.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد این واکسن، از جمله عوارض جانبی، دفترچه اطلاعات محصول را با جستجوی کارت زرد کروناویروس مطالعه نمایید.

همچنین می توانید از طریق برنامه کارت زرد (Yellow Card) عوارض جانبی مشکوک واکسنها یا داروها را گزارش کنید.

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

واکسیناسیون، کمک به محافظت
از کسانی که آسیب پذیرتر هستند.

اگر به اطلاعات بیشتری در زمینه واکسیناسیون
کووید-19 نیاز دارید، لطفاً به اینجا مراجعه نمایید:

www.nhs.uk/covidvaccinationمن در یکی از گروههای مندرج در بالا
هستم. چرا باید منتظر بمانم؟

همزمان با تأیید واکسنهای کووید-19 و تولید خط های جدید، واکسن در دسترس قرار می گیرد.

بنابراین هر دوز برای محافظت از افرادی که در بالاترین میزان خطر قرار دارند مورد نیاز است. به محض اینکه واکسن کافی موجود باشد، از شما دعوت می شود مراجعه کنید.

برخی افراد که خانه نشین هستند یا در خانه سالمندان سکونت دارند و نمی توانند به مرکز محلی واکسیناسیون بروند ممکن است مجبور شوند تا زمان ارائه نوع مناسب واکسن صبر کنند. این مسئله بدین دلیل است که فقط برخی واکسنها را می توان به منزل افراد حمل کرد.

از کجا می توانم واکسن کووید-19 خود را
دریافت کنم؟

واکسنها در مکانهای مختلفی ارائه می شود. برخی تیمهای واکسیناسیون به افراد مراجعه می کنند تا واکسن را ارائه کنند، برای مثال در خانه های سالمندان، و افراد دیگر ممکن است مجبور شوند به نزدیکترین مرکز بروند. از آنجا که برخی واکسنها باید در فریزر با دمای خیلی پایین نگهداری شود، ممکن است نتوانید واکسن را در درمانگاه پزشک عمومی خود دریافت کنید.

اگر مرکزی که من پیشنهاد شده به راحتی در
دسترس نباشد چه می شود؟

لطفاً سعی کنید به مرکز واکسیناسیون پیشنهاد شده مراجعه نمایید. اگر نمی توانید به آن مرکز مراجعه کنید، ممکن است مجبور شوید صبر کنید تا واکسن را در مکانی راحتتر دریافت نمایید.

زمانیکه واکسن به شما ارائه شد باید آن را دریافت کنید، اگر این شرایط را دارید:



مراقبت کننده ای که در آسایشگاه سالمندان کار می کند



کارکنان خط مقدم مراقبت های اجتماعی



کارکنان خط مقدم مراقبت های بهداشتی



ساکن آسایشگاه برای سالمندان

به افرادی که بیشتر در معرض خطر مشکلات کووید-19 هستند زودتر واکسن ارائه می شود.

لیست بیماریهای بالینی:

- انواع سرطان خون (مانند لوسمی، لنفوم یا میلوما)
 - دیابت
 - زوال عقل
 - مشکلات قلبی
 - مشکلات قفسه سینه یا تنفسی، از جمله برونشیت، آمفیزم یا آسم شدید
 - بیماری های کلیوی
 - بیماری های کبدی
 - موارد کاهش ایمنی ناشی از بیماری ها یا اقدامات درمانی (مانند ابتلاء به HIV، استفاده از داروهای استروئیدی، شیمی درمانی یا پرتو درمانی)
 - انواع سرطانی خون (مانند لوسمی، لنفوم یا میلوما)
 - دیابت
 - زوال عقل
 - مشکلات قلبی
 - مشکلات قفسه سینه یا تنفسی، از جمله برونشیت، آمفیزم یا آسم شدید
 - بیماری های کلیوی
 - بیماری های کبدی
 - موارد کاهش ایمنی ناشی از بیماری ها یا اقدامات درمانی (مانند ابتلاء به HIV، استفاده از داروهای استروئیدی، شیمی درمانی یا پرتو درمانی)
- آرتریت روماتیسمی، لوپوس یا پسوریازیس
 - پس از پیوند اعضا
 - پس از سکتة مغزی یا حمله ایسکمیک گذرا (TIA)
 - بیماری سیستم عصبی یا بیماری های تحلیل عضلانی
 - معلولیت ذهنی شدید یا عمیق
 - مشکلات طحال، مانند بیماری سلولهای داسی شکل، یا اگر طحال شما برداشته شده
 - اضافه وزن بسیار زیاد (شاخص توده بدن 40 و بالاتر)
 - بیماری روانی شدید

همزمان، واکسن به این افراد نیز ارائه می شود:

- بزرگسالانی که مراقبت دائمی برای فردی سالخورده یا معلول ارائه می کنند
- بزرگسالان با سن پایینتر که در محیطهای پرستاری درازمدت یا آسایشگاهی سکونت دارند

پس از آن، واکسن به ترتیب سنی به این افراد ارائه می شود:

- افراد بالای 80 سال
- افراد بالای 75 سال
- افراد بالای 70 سال
- بزرگسالان موجود در فهرست بیماران محافظتی NHS
- افراد بالای 65 سال
- بزرگسالان زیر 65 سال با بیماری دراز مدت (لیست را مشاهده کنید).
- به افراد 64-50 سال بعداً ارائه می شود.

لطفاً منتظر نوبت خود بمانید. اگر در گروههای بالا نیستید، باید برای واکسیناسیون کووید-19 منتظر بمانید تا موجودی بیشتری در دسترس باشد.

وقتی واکسن بیشتری موجود باشد، ما آنها را به گروههای بیشتری از جمعیت ارائه می کنیم.

در بریتانیا، دو نوع واکسن کووید-19 تایید شده وجود دارد. برای ایجاد محافظت طولانی مدت تر، در هر دو نوع این واکسن ها نیاز به استفاده از دو دوز می باشد. هر دو نوع در آزمایشهای بالینی ایمن و موثر نشان داده اند و نتایج ایمنی آنها خوب بوده است.

یک گروه متخصص مستقل به NHS توصیه کرده است که واکسن کووید-19 را ابتدا به کسانی ارائه کند که بالاترین خطر ابتلاء به بیماری و بیشترین خطر عوارض شدید ناشی از این بیماری را دارند. این گروه شامل بزرگسالان ساکن در آسایشگاهها، و افراد خط مقدم مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی می شود.

هرگاه تعداد واکسن بیشتری موجود باشد، در اولین فرصت ممکن به دیگر افرادی که در معرض خطر هستند واکسن ارائه خواهد شد.