

2.2 VEGETACIÓN: FORMACIONES DE BOSQUE SECO
(DECIDUOS Y SEMIDECIDUOS)

Israel G. Vargas & Claudia G. Jordán



Guía de Campo # 1 Versión 1.Feb.2004

ISBN: 99905-66-03-8

Bosque decido, El área mas representativa con este tipo de cobertura vegetal en el Parque se restringe al sector NE de la meseta, se observa sin dificultad por laderas atrás del campamento de Las Torres y subiendo la senda en laderas arriba del Lago Caimán. Su topografía es accidentada, de suelos superficiales derivados de las rocas areniscas de la meseta.

La característica principal es que casi todos los árboles pierden sus hojas en la prolongada estación seca. Las especies características de este ambiente son: *Copaifera langsdorfii*, *Terminalia fagifolia*, *Commiphora leptophloeos*, *Callisthene microphylla*, *Erythroxylum tortuosum*, *Acacia multipinnatum* y *Diospiros sp.* También hay algunas lianas y un bambú enano forma colonias predominante *Actinocladon verticillatum*.



Laderas cerca del campamento de Las Torres

Bosque semideciduo, Las formaciones de bosque semideciduo en el Parque es una extensión más norteña del bosque semideciduo chiquitano que cubre gran parte del escudo precámbrico en el departamento de Santa Cruz.

En el parque se presentan sólo en alrededores de algunos afloramientos rocosos (inselbergs) y sobre laderas inferiores del sector Sur de la meseta. Desafortunadamente el bosque seco no se encuentra bien representado dentro de los

límites del Parque, afortunadamente ahora cuenta con una protección adecuada en otros sectores del país como en Tucavaca.



Vegetación del Cerro Pelao en época seca

La cobertura del dosel arbóreo es de 15-20 m de altura y los emergentes hasta 25 m. Tiene un sotobosque herbáceo denso en el interior por la buena entrada de luz.



Algunas de las plantas características en grietas de rocas

La fenología es flexible según el grado de deficiencia hídrica en la estación seca, es decir, que el grado y la duración de la caída de las hojas se agudiza cuanto más prolongada y fuerte se presente la época seca.

Las especies dominantes del bosque semideciduo son: *Anadenanthera colubrina*,