



Tipa del baño (*Macarobium acacifolium*)

Bosque de sartenejales. Es un bosque alto con mal drenaje, asociado a las llanuras del río, inundado en alguna temporada del año. La topografía del suelo es irregular con montículos o plataformas elevadas sobre canales irregulares que son inundadas estacionalmente.



Bosque ribereño al borde del río Paraguá

Se encuentra ubicada a mayor distancia del cause del río y se forma debido a la acción de termitas. Las plataformas varían en tamaño, desde 3-10 m de diámetro y en altura hasta 1,5 m del nivel del suelo.

El bosque tiene un nivel arbóreo entre 10-20 m de alto con emergentes hasta 35 m. Es un bosque diverso algo variable en su composición ya que presenta una mezcla de especies de tierras altas que crecen sobre los montículos y aquellas que se establecen sobre los canales bajo inundación mas prolongada. Es uno de los hábitat mas apropiado para el crecimiento del palmito o asái (*Euterpe precatoria*).

Bosques de pantanos, Suelos permanentemente saturados por agua filtrantes en la base de la serranía (nunca inundación de aguas de ríos más cercanos).

Se caracteriza por una densidad alta de tallos de especies arbóreas, en las que sobresalen *Euterpe precatoria*, *Pseudolmedia rigida*, *Guatteria spp.*, *Xylopia spp.* y otras.

En la meseta existe bosques sobre suelos pantanosos ubicados en valles angostos con arroyos pequeños y aguas fluyentes de las laderas superiores; la especie mas notoria en sitios es la palma real (*Mauritia flexuosa*), que se establece especialmente al borde de arroyos con agua permanente, mientras que la palma marfil (*Mauritiella aculeata*) crece en sitios temporalmente anegados.



Arroyos de la serranía con palma *Mauritia flexuosa*